



Melko aikainen yleisperuna, joka sopii myös kuorintaan

- Melko aikainen
- Erittäin satoisa
- Soveltuu sekä pakkaamoille että kuorintaan
- Keltamaltainen ja matalasilmäinen



Lajikeominaisuudet

Aikaisuus	Melko aikainen
Keittotyyppi	Yleisperuna
Kuoren väri	Keltainen
Kuoren kirkkaus	9 ● ● ● ● ●
Mukulan muoto	Soikea
Tärkkelyspitoisuus, ka	14%
Mustelmoituminen	8 ● ● ● ● ●
Vihertymisenkesto keinovalossa	6 ● ● ● ● ●
Keittotummuminen	8 ● ● ● ● ●
Raakatummuminen	9 ● ● ● ● ●



Keittotyyppi



Aikaisuus

Istutus

Siemenkoko	28-35 mm	35-55 mm
Istutusväli	22 cm	26 cm
Riviväli	80 cm	80 cm
Kg/ha	1 400	3 300

Kestävyydet

Perunarupi	9 ● ● ● ● ●
Kuoriokko	7 ● ● ● ● ●
Maltokaarivirus	9 ● ● ● ● ●
Mukularutto	6 ● ● ● ● ●
Lehtirutto	6 ● ● ● ● ●
Lehtipolte	7 ● ● ● ● ●
Y-virus	6 ● ● ● ● ●
Metributsiini	6 ● ● ● ● ●
Ankeroinen (PCN)	
Ro 1/4	9 ● ● ● ● ●
Ro 2/3	6 ● ● ● ● ●
Pa2	-
Pa3	-

Lannoitus

Libran typpilannoitus hieman keskimääräistä matalampi.

Viljavuustuloksiin perustuva riittävä maan fosfori-, kalium- ja kalsiumlannoitus.

Huolehdi myös kaikkien muiden sivu- ja hivenaineravinteiden, erityisesti magnesiumin (Mg), mangaanin (Mn) ja boorin (B) tasapainoisesta lannoituksesta.



Yleiset viljelyohjeet



Valmistelu

Lohkovalinta:

Libran viljely onnistuu kaikilla perunalle soveltuvilla maalajeilla. Libra on hieman arka kuorirokolle, joten huomioi tämä lohkovalinnassa. Lajike kestää hyvin istutuksen myös kylmään maahan.

Idätys:

Etenkin varhaiseen satoon tähdättäessä normaali idätys 2-3 viikkoa +10..+12 °C on suositeltavaa. Libran itämislepo on melko kevyt ja taimettuminen nopeaa. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta, jotta siemenperunoihin ei kerry kosteutta.



Kasvinsuojelu

Huolellinen siemenenpeittäus perunseittiä vastaan on suositeltavaa.


Libra on melko arka Metributsiinille. Metributsiiniä voi käyttää vain ennen taimettumista. Normaalit rutontorjuntatimet. Libra on hieman herkkä lehtipoltteelle.



Nosto ja muu käsittely

Seuraa mukulakokoa loppukautta kohti mentäessä välttääksesi ylisuuria mukuloita.

Libra muodostaa kestävän kuoren keskimääräistä hitaammin. Kuorenkehitys vaatii tavallista pidemmän ajan, yleensä noin 2-4 viikkoa.



Varastointi ja myynti

Nopea alkukuivatus on suositeltavaa heti noston jälkeen, sillä se parantaa varastosäilyvyyttä. Huolehdi tasaisista varasto-olosuhteista koko varastoinnin ajan. Ota huomioon Libran varastoinnissa ja kauppakunnostuksessa lajikkeen vihertymisherkyys.